

**ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 536 DEL 16 MARZO 2007**

**Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame**

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	totale		Nel liquame	Nel letame
	Kg/capo/anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno
<b>Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.</b>	26,4	101		
Stabulazione senza lettiera			101	
Stabulazione su lettiera				101
<b>Suini: accrescimento /ingrasso</b>	9,8	110		
Stabulazione senza lettiera			110	
Stabulazione su lettiera				110
<b>Vacche in produzione (latte) (peso vivo 600 Kg/capo)</b>	83	138		
Fissa o libera senza lettiera			138	
Libera in lettiera permanente			62	76
Fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
Libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
Libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
<b>Rimonta vacche da latte (peso vivo 300 Kg/capo)</b>	36	120		
Libera in box su pavimento fessurato			120	
Libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
Fissa con lettiera			26	94
Libera in lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
Libera in lettiera permanente anche in zona alimentazione			17	103
Libera su lettiera inclinata			17	103
Vitelli su pavimento fessurato			120	
Vitelli su lettiera			20	100
<b>Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)</b>	33,6	84		
Libera in box su pavimento fessurato			84	
Libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
Fissa con lettiera			18	66
Libera in lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
Libera in lettiera permanente anche in zona alimentazione			12	72
Libera su lettiera inclinata			12	72
<b>Vitelli a carne bianca su pav.to fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)</b>	8,6	67	67	
<b>Vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)</b>	8,6	67	12	55
<b>Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)</b>	0,46	230		
Ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
Ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
Ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
<b>Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo)</b>	0,23	328		
Pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
Pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328
Pollastre a terra su lettiera				328
<b>Broilers polli da carne (peso vivo: 1 kg/capo)</b>	0,25	250		
A terra con uso di lettiera				250
<b>Tacchini</b>				
Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio : 9 kg/capo)	1,49	165		165
Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio : 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
<b>Faraone (peso vivo: 1 kg/capo)</b>	0,19	240		
A terra con uso di lettiera				240
<b>Cunicoli</b>				
Fattrici in gabbia con asportazione manuale o meccanica (raschiatore) (peso vivo medio : 3,5 kg/capo)		143		143
Capo all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o meccanica (raschiatore) (peso vivo medio : 1,7 kg/capo)		143		143

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	totale		Nel liquame	Nel letame
	Kg/capo/anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno
<b>Ovicaprini</b>		99		
Con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
Su pavimento grigliato o fessurato			99	
<b>Equini</b>		69		
Con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE